

STRUČNÝ POPIS PŘEVAZŮ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Adéla Holubová



7. - 8. listopadu 2024, ČAS DOMA, Brno

Nehojící se rána

Wound Healing Society – 4 kategorie nehojících se ran na základě etiologie:

- **poškození kožního krytu, které se hojí neobvykle pomalu. Rána, kde klíčovou sehrává časový faktor, který se pohybuje v rozmezí 4 týdnů a déle**

1. Dekubity
2. Nehojící se rány na podkladu venózní nedostatečnosti
3. Nehojící se rány na podkladu arteriální nedostatečnosti
4. Diabetické vředy (World Union Of Wound Healing Societies, 2016)



Foto: archiv autorky

SPEKTRUM NEHOJÍCÍCH SE RAN

1. Bércové vředy
2. Syndrom diabetické nohy
3. Dekubity
4. Nehojící se rány na podkladu ICHDK
5. Popáleniny
6. Dehiscence operačních ran



Foto: archiv autorky

SPEKTRUM NEHOJÍCÍCH SE RAN

7. Onkologické rány

8. Kožní trhliny

9. Sororigenní rány

10. Postradiační dermatitidy

11. Jiné



Foto: archiv autorky

PROČ FÁZOVÉ HOJENÍ RAN?

- Snížení počtu převazů (oproti klasickým převazům)
- ⬇ bolestivost, spotřeba analgetik
- Rychlejší čistění spodiny a granulace
- Zkrácení celkové doby léčení
- Menší pracovní zátěž ošetrovatelského personálu
- ⬇ nákladů na celkovou léčbu nehojících se ran (Stryja a kol., 2011)

Při vhodném výběru materiálu můžeme ovlivnit exsudaci a zápach rány



ZKVALITNIT ŽIVOT PACIENTA



13.10.2020



10.11.2020



5.5.2021

Foto: archiv autorky

KLASICKÁ TERAPIE A FÁZOVÉ HOJENÍ RAN

KLASICKÁ TERAPIE
HOJENÍ RAN

ICHDK

**Bez tepenné
intervence !!!!**




FÁZOVÉ HOJENÍ
RAN

Nehojící se rány

**ICHDK s tepennou
intervencí**



KVALITNÍ PÉČE O RÁNY JE MULTIOBOROVÁ PÉČE



... I ZÁZRAKY SE DĚJÍ ...



10.5.2017



6.6.2017



31.10.2017



16.7.2021



9.8.2021



10.11.2021



Foto: archiv autorky

... I ZÁZRAKY SE DĚJÍ ...



17.4.2019



2.5.2019



24.6.2019



16.10.2019



25.9.2020



4.2.2021



Foto: archiv autorky




Foto: archiv autorit



Foto: archiv autorit

AMBULANCE HOJENÍ RAN NEHOJÍCÍ SE RÁNA/ CHRONICKÁ RÁNA



NEHOJÍCÍ SE RÁNA NEBO TAKÉ CHRONICKÁ RÁNA je poškození kůže a hlubších tkání, které se hojí pomalu – nejméně 4 týdny. Mezi nehojící se rány řadíme např.:

1. **PROLEŽENINY/TLAKOVÉ VŘEDY** (dekubity)
2. **BĚRCOVÉ VŘEDY** (ulcus cruris žilního i tepenného původu)
3. **DIABETICKÉ VŘEDY** (syndrom diabetické nohy)
4. **ONKOLOGICKÉ RÁNY**

KDE SE MŮŽETE LÉČIT S NEHOJÍCÍ SE RÁNOU?

Nejlépe v ambulancích s garancí kvality péče od České společnosti pro léčbu ran.

Tyto ambulance naleznete na:



www.zahojime.cz/odbornici/organizace-pece-o-nehojici-se-rany



- | | |
|------------------------|--------------|
| • Benešov | • Olomouc |
| • Bohumín | • Ostrava |
| • Boskovice | • Pardubice |
| • Brno | • Pelhřimov |
| • Břeclav | • Paseka |
| • Bruntál | • Plzeň |
| • České Budějovice | • Praha |
| • Český Těšín | • Přelouč |
| • Čáslav | • Přerov |
| • Chrudim | • Semily |
| • Hradec Králové | • Soběslav |
| • Havlíčkův Brod | • Sokolov |
| • Jihlava | • Stod |
| • Kadaň | • Strakonice |
| • Kolín | • Šumperk |
| • Kroměříž | • Teplice |
| • Liberec | • Třebíč |
| • Most | • Třinec |
| • Nové Město na Moravě | • Vsetín |

PODIATRICKÉ AMBULANCE

Pokud máte diabetickou nohu (např. ránu na noze související s cukrovkou), měli byste navštěvovat podiatrickou ambulanci.

Tyto ambulance naleznete na:



www.diab.cz/seznam-podiatrickych-ambulanci

- | | |
|--------------------|------------------|
| • Brno | • Ostrava |
| • Benešov | • Ostrava |
| • Břeclav | • Pardubice |
| • České Budějovice | • Plzeň |
| • Frydek-Místek | • Praha |
| • Havlíčkův Brod | • Příbram |
| • Hradec Králové | • Benešov |
| • Chotěboř | • Soběslav |
| • Jihlava | • Sušice |
| • Jilemnice | • Trutnov |
| • Karlovy Vary | • Třinec |
| • Liberec | • Ústí nad Labem |
| • Mladá Boleslav | • Zlín |
| • Olomouc | |

Tento letáček je k dispozici také v elektronické podobě na:

www.zahojime.cz



ZAHOJÍME

Pacientská organizace ZAHOJÍME z.s.

Datum vydání: březen 2024, 1. vydání, Sezimovo Ústí 2024

Grafika: Ing. Jana Vaňková



ZAHOJÍME

WWW.ZAHOJIME.CZ

STRUČNÁ DOPORUČENÍ PRO LAICKOU VEŘEJNOST PÉČE O RÁNY V DOMÁČÍM PROSTŘEDÍ



Jak se správně starat o ránu?
Co dělat s nehojící se ránou?
Kde hledat pomoc v případě komplikací?

Hlavní autorka: PhDr. Adéla Holubová, Ph.D., MBA
Spoluautoři: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., MUDr. Jan Stryja, Ph.D.,
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Materiál schválený Česká společnost pro léčbu ran

STRUČNÁ DOPORUČENÍ PRO LAICKOU VEŘEJNOST

PŘI PŘEVAZECH V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Pokud je to možné, provádějte převaz v **dopoledních hodinách**. Po převazu budete pravděpodobně pociťovat mírnou bolest (což je normální), která by měla odeznít cca do 3 hodin. Pacienti s cukrovkou nemusí pociťovat žádnou bolest. Pokud vnímáte silnou bolest, požádejte svého ošetřujícího lékaře o **léky proti bolesti**. Velká bolest v raně brání v procesu hojení.

Následující postup je určen soběstačným či částečně soběstačným pacientům.

A) Příprava pomůcek a plochy k provedení převazu



1. PŘÍPRAVA PŘEVAZOVÉ PLOCHY

- Převaz provádějte na ploše, která je omyvatelná.
- Vydezinfikujte převazovou plochu dezinfekcí na tyto plochy určenou.
- Místo převazu chraňte nesmáčivou podložkou.



2. VYDEZINFIKUJTE SI RUCI alkoholovou dezinfekcí a vyčkejte do zaschnutí.



3. JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

- Navlékněte si první pár jednorázových rukavic.

B) Provedení převazu, hygieny rány a aplikace krytí

Odstranění materiálu použitého k předcházejícímu převazu rány provádíme stranou (nejlépe v koupelně) od připravené, čisté plochy (bod A-1).



4. ODSTRANĚTE STARÝ PŘEVAZOVÝ MATERIÁL

- Použitý převazový materiál postupně odkládejte na předem připravenou jednorázovou podložku nebo ho vložte přímo do igelitového sáčku.



5. HYGIENA RÁNY

- Osprchujte ránu a její okolí nejlépe v rozsahu 20 cm od rány (pokud je rána na noze, pak i mezprstní prostory).



- Ruce v rukavicích si namydlete, umyjte nejprve spodinu rány, poté její okolí.
- Použijte např. gázové čtverce nebo průmyslově vyráběné prostředky pro čištění rány a krouživými pohyby umyjte spodinu rány (drobného krváčení ze spodiny rány se nemusíte obávat).
- Za použití jednorázových ručníků okolí rány osušte (pokud je rána na noze, pak i mezprstní prostory).
- Použitý materiál vložte do igelitového sáčku.
- Sundejte jednorázové rukavice a vložte je do igelitového sáčku.



6. VYDEZINFIKUJTE SI RUCI alkoholovou dezinfekcí a vyčkejte do zaschnutí.

7. PŘESUŇTE SE K MÍSTU, KDE JSTE SI VYDEZINFIKOVALI PŘEVAZOVOU PLOCHU

- Položte ošetřovanou část těla na nesmáčivou podložku.



8. JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

- Navlékněte si druhý pár jednorázových rukavic.



9. APLIKACE PŘEVAZOVÉHO MATERIÁLU

- Aplikujte materiál určený k převazům rány.
- Materiál určený k vyhození vložte do igelitového sáčku.
- Promažte kůži v okolí rány zvláčňujícím krémem.
- Nikdy neaplikujte krém na ránu a do mezprstních prostor.



C) Úklid a dezinfekce ploch

10. ÚKLID

- Materiál určený k vyhození (včetně jednorázových rukavic) vložte do igelitového sáčku.
- Igelitový sáček s převazovým materiálem vyhodte do k tomu určeného odpadu. Postupujte dle pokynů, které jste obdrželi od ošetřujícího personálu.



11. DEZINFEKCE PLOCH

- Vydezinfikujte převazovou plochu dezinfekcí na tyto plochy určenou.
- Vydezinfikujte místo, kde jste odstraňovali převazový materiál, a sprchu či vanu, kde jste ránu omývali.



12. VYDEZINFIKUJTE SI RUCI alkoholovou dezinfekcí a vyčkejte do zaschnutí.

Ručníky, ložní prádlo, oblečení aj., které je ve styku se sekrem z rány či s ránou samotnou, perte minimálně na 60 °C s přidáním dezinfekčním prostředkem (pokud je to možné).

D) Aplikace pomůcek specifických pro léčbu konkrétního onemocnění



APLIKACE KOMPRESIVNÍCH OBINADEL (BANDÁŽE DOLNÍCH KONČETIN)

- Typ bandáže dolních končetin provádějte dle doporučení lékaře.

POUŽÍVÁNÍ ODLEHČOVACÍCH POMŮCEK

u pacienta s diabetickou nohou. Odlehčení postižené části nohy je pro hojení rány velice důležité.




POUŽÍVÁNÍ VHODNÝCH POMŮCEK

K POLOHOVÁNÍ PACIENTŮ S PROLEŽENINAMI

Snížení tlaku a třecí síly je pro léčbu proleženin velmi podstatné a působí preventivně proti vzniku nových tlakových vředů (dekubitů).

NEJČASTĚJÍ MÍSTA VZNIKU PROLEŽENIN V POLOSEDU A V SEDU



POZOR NA MOŽNÉ KOMPLIKACE!



V následujících případech se může jednat o známky možného **ZÁNĚTU/INFEKCE A ZHORŠENÍ STAVU RÁNY**:

- viditelné prohloubení rány
- změna barvy nohy
- bolestivost je větší než obvykle
- výskyt otoku je větší než obvykle
- zarudnutí (zčervenání) okrajů a okolí rány
- teplé až horké okolí rány
- pocit tepla/horkosti v ráně
- zápach rány je větší než obvykle
- sekrece z rány je větší než obvykle
- sekret z rány je hustější než obvykle (má nažloutlou až nazelenalou barvu nebo barvu mléka)
- na spodině rány převažuje žlutá nebo černá barva (tento stav je horší ve srovnání s předchozím stavem rány)
- zhoršená funkce končetiny či části těla, na které je rána (tento stav je horší než obvykle)
- výskyt macerace (rozmočené okraje) na okrajích a v okolí rány

Pokud pozorujete tyto známky zánětu/infekce a zhoršení stavu rány, zkontaktujte ambulanci/ zdravotnický personál, který vám ránu léčí!

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


Rány mohou být kontaminovány bakteriemi odolnými vůči běžným antibiotikům. Pacient by si neměl bez předchozí porady s lékařem sám aplikovat antibiotika (včetně lokálních prostředků, např. mastí). Při nevhodně zvolené antibiotické léčbě narůstá odolnost bakterií vůči antibiotikům. Pacient a další laičtí pečující by měli dodržovat základní hygienická opatření (mytí a dezinfekci rukou), a to i v případě, že se dotýkají obvazového materiálu (mimo převaz). **Obvazový materiál potřísněný sekrem může kontaminovat okolí pacienta!**

Rány, které zasahují do hlubokých vrstev tkání nebo až ke kosti, by se sprchovat neměly. **O sprchování rány se vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem nebo s konzultantkou pro hojení ran.**

HYGIENA RÁNY

JWC International Consensus Document

Defying hard-to-heal wounds with an early antibiofilm intervention strategy: wound hygiene



1. Ošetření rány a jeho okolí
2. Débridement
3. Oživení okrajů rány
4. Aplikace krytí



Hygiena rány je čtyř krokový režim čištění a dekontaminace rány a odstranění překážek bránících hojení, které bývají často způsobeny přítomností biofilmu.

Všechny intervence mají být součástí každého převazu až do zhojení rány



Murphy C, et al., 2020. International consensus document. Defying hard-to-heal wounds with an early antibiofilm intervention strategy: wound hygiene. J Wound Care 2020; 29(Suppl 3b):S1–28.

Foto: autorka

STRATEGIE MANAGEMENTU BIOFILMU V RÁNĚ

Strategie managementu biofilmu v ráně spočívá v **očištění rány mechanicky i fyzikálně**, čímž **dochází k narušení struktury biofilmu** a napomáhá se odstranění biofilmu ze spodiny rány. Dochází k možnosti účinků materiálu pro hojení ran a zároveň zlepšení účinnosti systémové antibiotické léčby (pokud je indikována). K obnově biofilmu dochází každých 24 - 48 hod. (Stryja, 2022).



Před
débridementem



Po
débridementu

Mikroorganismy	Typů složek životního prostředí ploch	dobu přežití
<i>Staphylococcus aureus</i> , včetně MRSA	suché neživé povrchy	7 dní do 5 let
	bavlněné tkaniny, syntetická vlákna, keramická dlažba s přítomností krve	60 až 72 dnů
	keramická dlažba, bavlněná tkanina syntetická vlákna, pěnové matrace (bez / s biologickými tekutinami)	> 70 dnů
	kancelářský papír	72 hodin do 7 dnů
<i>Staphylococcus aureus</i> , vankomycin rezistentní	vinylové podlahy a hladké povrchy	> 45 dní
<i>Enterococcus species</i> , včetně VRE	suché neživé povrchy	5 dnů do 5 let
	keramická dlažba, bavlněná tkanina, syntetická vlákna, pěnové matrace (bez / s biologickými tekutinami)	21 dní
	kancelářský papír	72 h na > 7 dnů
<i>Escherichia coli</i>	suché neživé povrchy	1,5 h do 16 měsíců
	kancelářský papír	<24 h
<i>Klebsiella species</i>	suché neživé povrchy	2 h na > 30 měsíců
	keramická dlažba, bavlněné tkaniny, syntetická vlákna, pěnové matrace	<14 dní
<i>Serratia marcescens</i>	suché neživé povrchy	3 dny pro 2 měsíce
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	suché neživé povrchy	6 h až 16 měsíců
	kancelářský papír	72 h na > 7 dnů
<i>Clostridium difficile</i>	suché neživé povrchy (výtrusy)	> 5 měsíců
	suché neživé povrchy (vegetativní forma)	15 min
	vlhké povrchy	6 h
<i>Acinetobacter species</i>	suché neživé povrchy	3 dny na 11 měsíců
<i>Candida species</i>	suché neživé povrchy	3 dny > 4 měsíce
Norovirus	suché neživé povrchy	8 h až 2 týdny

(Zdroj: Suleyman et al., 2018, s. 4)



6 h – 16 m



3 d – 2 m



7 d – 5 let

SULEYMAN, G., et al., 2018. The Role of Environmental Contamination in the Transmission of Nosocomial Pathogens and Healthcare-Associated Infections. *Current Infectious Disease Reports*. 20(12), 1–12. ISSN 1523-3847

Foto: autorka



CO OČI NEVIDÍ, TO
SRDCE NEBOLÍ...



Fluorescenční technologie MolecuLight je metoda, která dokáže zobrazit mikroorganismy na spodině rány. **Bakterie** na spodině rány a jejím okolí vyzařují pod UV světlem **červenou a modrozelenou barvou**. Zdravá kolagenní tkáň vyřazuje světlo zelené barvy.

Zobrazení mikroorganismů na spodině rány a okolí pomocí technologie MolecuLight (zdroj: [Salvatella s.r.o.](#))



Zdroj: <https://www.lohmanrusher.info/>



Zdroj: <https://www.hartmann.info/>

ZAHOJÍME, z.s.

NÁŠ CÍL:

Profesionální, patientská organizace s podporou odborných společností a širokou patientskou základnou

NAŠE MOTO:

Pacienti, pečovatelé a zdravotníci se spojují v boji proti nehojícím se ranám

Zákon č. 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

PÉČE O KŮŽI A SLIZNICE při cílené léčbě s anti-EGFR protilátkami

PROJEVY

KOŽNÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY se objeví v různé intenzitě u více než 80 % pacientů, zhruba u 15% jsou významnější. Mezi hlavní projevy patří především:

SUCHÁ KŮŽE A SVŘEBÍ
- mírné projevy, ale velmi časté

VYBÁZKY PODOBNÉ AKNĚ (AKNEIFORMNÍ)
- obvykle na hlavě a obličejí okolo nosu a úst, na hrudníku, rozvíjí se většinou během jednoho nebo dvou týdnů od zahájení léčby

ZÁNĚTY NEHTOVÉHO LŮŽKA (PARONYCHIA)
- spíše se při delší léčbě s cetuximabem, obvykle za 2 měsíce

ZÁNĚTY A SUCHOST SLIZNICE
- postižení bývá u sliznic dutiny ústní, očí, genitálu

ZMĚNY RAS A VLASŮ
- intenzivnější růst řas (trichomegalie), změny a řídnutí vlasů a vousů

DALŠÍ MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY zahrnují nízkou hladinu hořčíku v krvi a reakce spojené s infuzí (horečka, zimnice, závratě a dýchací potíže - premedikace před infuzí je u cetuximabu nutností).

DEFINICE

anti-EGFR monoklonální protilátka = cílené biologické léčivo, protilátka (bílkovina, imunoglobulin) blokuje působení růstového faktoru pro epitel kůže a sliznic a tím pak blokuje i jeho stimulační efekt pro buňky karcinomu sliznice dutiny ústní nebo tlustého střeva. Léčba tímto protilátkami může být doprovázena i některými vedlejšími účinky, které se týkají převážně kůže nebo sliznic. Základní anti-EGFR protilátky jsou cetuximab a panitumumab.



Typický výjev podobný akně (akneiformní ekzém) okolo úst, ragely rtů a jazyk tonzily.



Typický výjev podobný akně (akneiformní ekzém) na hrudi.



Praskliny kůže na prstech.




Záněty nehtového lůžka (paronychia).

JAK POSTUPOVAT

Uvedené postupy a roztoky vycházejí z odkazů na literaturu uvedenou níže a nenahrazují potřebu individuálního rozhodnutí a vedení péče u konkrétního pacienta.

POUČENÍ PRO PACIENTA



- **VYHÝBEJTE SE SLUNEČNÍMU ZÁŘENÍ**, používejte opalovací krémy s vysokým faktorem (páše 50).
- Pravidelně používejte **HYDRATAČNÍ KRÉMY** k omezení suchosti a svědění pokožky, během dne a hned po sprše nebo koupeli.
- K hygieně využijte ideálně **PŘÍPRAVKY PRO ATOPICKY**.
- Pravidelně **SLANĚ KOUPĚJTE NOHY A RUKOU** (např. 1 dle možností soli v 5 litrech vlažné vody) pomůlkou zmrčkovat a čistit pokožku rukou a nohou.
- Pupínky kůže **NEVYMAČKÁVEJTE**, aby nedocházelo k dalšímu podráždění, lze je zakrýt korektorem.
- Nezapomejte a **NEPOUŽÍVEJTE PŘÍPRAVKY S OBSAHEM ALKOHOLU** určené k léčbě akné, protože zde nebyly účinné a vysušují pokožku.
- **NEHOLTE SE ŽILTKAMI** pro riziko zarůstání vousů a chloupků.
- Noste volné boty, prodyšné ponožky, noste šaty nehy při nakrátko a nezatačujte netřasou látkou pro omezení zánětu nehtového lůžka.
- Chraňte oči před větrem, prachem, slunečním zářením, ostrým světlem a ranním oplachováním očí vodou z kohoutku, používejte prodeje zvlhčující oční kapky nebo gely v malých baleních a při tvrdém očištění nebo projevu zánětu ihned kontaktujte svého lékaře.
- Pro použití při pohyblivém styku jsou vhodné volně prodejné lubrikanty.
- Je nutné důsledně pečovat o **HYGIENU DUTINY ÚSTNÍ** (informace v samostatné kapitole).
- Při **RADIOTERAPII** se péče o kůži týká speciální pokyny (informace v samostatné kapitole).

OŠETŘOVATELSKÁ INTERVENCE - PŘÍPRAVKY PÉČE O KŮŽI

- Preferujeme **HYDRATAČNÍ KRÉMY** (základní hydratační s přípravou v lékárně je Am-biderman), mohou být s obsahem např. urey. Při velké suchosti, nebo pálení krému lze pak zkusit mastnější přípravky, masti (základní mastnější s přípravou v lékárně je Cutlan).
- Při rozvoji výsevu podobného akné jsou na ošetření postižených míst vhodné **KRÉMY S KORTIKOIDY** a po zklidnění pak **KRÉMY S ANTIOTIKY** (především s metronidazolem), jejich použití je třeba konzultovat s lékařem, který může s ohledem na typ a rozsah postižení předepsat pacientovi i pravidelné užívání tabletových **ANTIBIOTIK** (velikostu dle pokynů).
- Záněty nehtového lůžka se ošetřují rovněž pomocí přípravků s obsahem **ANTIBIOTIK A KORTIKOIDŮ**, lze i **ANTIMIKROBÁLNÍ** přípravky s povídkou iodinem atp.
- Praskliny kůže rukou nebo nohou lze ošetřit např. pomocí **MAPLAT** nebo lze i **ZALEPT POMOČI VTERINOVÉHO LEPIDLA**, okolní vrstvu kůže ošetřovat mastmi s **KE-RATOLYTIKY** (např. 20% urea v Cutlanu, 5% salicylová vazelína).
- Při **RADIOTERAPII** pečujte o kůži podle doporučení ve specifické kapitole.
- Při **POSTIŽENÍ DUTINY ÚSTNÍ** postupujte podle doporučení ve specifické kapitole.

Zpracoval: prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D., LF UK a FN v Plzni, 12.2.2023. Podle literatury: Erbitux® cetuximab - příručka pacienta. → FVBERB/0918/0004 (v1-Q) Susanna Jonkka, Merck, www.merck.fr; P.Fialová, Kožní komplikace, in S. Vokurka et al. Komplikace onkologických pacientů a možnosti jejich řešení v primární péči, GRADA 2022, ISBN 978-80-271-3556-1. Foto autor: Samuel Vokurka, se svolením pacientů. Vydáno: Praha, 2/2023, Dialog Jesenius o.p.s.



PÉČE O KŮŽI A SLIZNICE PŘI LÉČBĚ S ANTI-EGFR PROTILÁTKAMI

POSTIŽENÍ KŮŽE při radioterapii (prevence a léčba)

Uvedené informace vychází ze základní publikace z multiborové spolupráce (Cvek J, et al. Doporučení pro preventivní a léčebnou péči o kůži pacientů podstupujících radioterapii. Klin Onkol 2021; 34(6): 481-487) a nenahrazují potřebu individuálního rozhodnutí a vedení péče u konkrétního pacienta.

PROJEVY

AKUTNÍ RADIODERMATITIDA
(do 90 dnů od zahájení ozařování)

1

- erytém
- suchost
- pálení svědění
- suchá deskvamace
- vlhká deskvamace
- v těžkých případech až nekróza tkáně

CHRONICKÁ RADIODERMATITIDA

2

- atrofie kůže
- fibróza podkoží
- teleangiektázie
- změny pigmentace

VELMI POZDNÍ NÁSLEDKY

3

- keratóza
- spinocelulární karcinom
- jiné kožní malignity

RIZIKOVÉ FAKTORY

- dávka a technika radioterapie
- rozsah a lokalizace ozařované oblasti
- konkomitanti chemoterapie
- kožní záhyby v oblasti
- světlý fototyp pleti
- dráždění ozařované oblasti (mechanické, chemické, fyzikální)



HODNOCENÍ TÍŽE KOŽNÍ REAKCE

STUPEŇ	KOŽNÍ REAKCE
RTOG 0	žádná viditelná změna na kůži
RTOG 1	mírný erytém, mírné napětí kůže, svědění
RTOG 2	výrazný erytém, suchá deskvamace, svědění, bolest
RTOG 2.5	vlhká deskvamace, žlutý / světle zelený exsudát, bolest s otokem
RTOG 2.5	souvislá (konfluentní) vlhká deskvamace, žlutý / světle zelený exsudát, bolest s otokem
RTOG 4	vředy, krvácení, nekróza

JAK POSTUPOVAT



POUČTE A INFORMUJTE

Informujte pacienta o možném postižení kůže a možné ochraně a péči (leták, brožura, web).



PREVENCE

Opatření v průběhu ozařování a do plného zhojení (zvýšená opatrnost v průběhu roku)

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

ODĚV Z BAVLNY bez tlaku a tření v ozařované oblasti (pozor švy, řetízky, batoh, atp.)

V ozařované oblasti NEHOLIT ŽILETKOU, optimálně ani strojky (poranění s riziky infekce).

V ozařované oblasti NEPOUŽÍVAT LEUKOPLAST (riziko poškození pokožky).

STÍNIT OZAŘOVANÉ OBLASTI, v okolí používat hypoalergenní přípravky s vysokým UV filtrem.

VYHÝBAT SE EXTRÉMNÍM TEPLOTNÍM výkyvům (saunování, ledování).

OMÝVAT VLAŽNOU VODOU, jemné mýdlo s neutrálním pH, nekoupat se v přírodních tocích a bazénech (riziko infekce, vysoušecí účinek chlorované vody)

DEODORANTY / ANTIPERSPIRANTY lze individuálně použít, ale někdy mohou dráždit – zvýšená opatrnost.

Pokožku OSUŠIT PŘIKLÁDÁNÍM MĚKKÉHO RUČNÍKU - netřít.

NEPOUŽÍVAT ZÁSPY, OLEJ, VAZELÍNU A SÁDLO do ozařované oblasti

PROSTŘEDKY A PŘÍPRAVKY OCHRANY KŮŽE



30-60 MINUT PŘED OZÁŘENÍM

PŘI VYSOKÉM RIZIKU radiační dermatitidy zvážit využití speciálních silikonových tenkých krytí nebo voděodolné bariérové filmy ve spreji, krému nebo gelu – aplikace denně 30-60 minut před ozářením.



NEJDŘÍVE 2 HODINY PO OZÁŘENÍ

Po krátké sprše, lze obkládat ozařované oblasti neдрáždivým oplachovým roztokem a nebo ošetřit vhodným hydratačním přípravkem:

2x denně zpočátku, pak dle potřeby gely, krémy a přípravky se zvýšeným obsahem vody, bez parfému, konzervantů, lanolinu a rostlinných extraktů (zkusit předem na neozařovanou pokožku k vyloučení alergie).



ZÁKLADNÍ PÉČE, INTERVENCE A ZÁSADY

Dodržovat zásady uvedené výše (Krek-Éz)

Nevhodné jsou záspy, oleje, vazelíny a sádlo (okluzivní efekt), neaplikovat mastné produkty před samotnou radioterapií.

Nevhodné jsou v průběhu radioterapie přípravky a materiály se stříbrem v iontové formě (riziko interakce s částicemi záření), při ozařování lze ponechávat pouze krytí atestovaná na takové použití.

Ve zdůvodněných případech (např. výrazná putridní infekce s nekrózou) lze po domluvě s radioterapeutem na nezbytně nutnou dobu do zlepšení ponechat v průběhu ozařování potřebné mastné krytí nebo s obsahem stříbra.



SPECIFICKÉ INTERVENCE U VYBRANÝCH SITUACÍ

ERYTÉM, SUCHÁ DESKVAMACE

HYDRATAČNÍHO KRÉMY, HYDROGELY, přípravky pro léčbu radiodermatitidy s VYSOKÝM OBSAHEM VODY, 1-5x denně, vždy nejdříve 2 hodiny po ozařování.

OCHLAZOVAT A OPLACHOVAT sterilními neдрáždivými roztoky na rány a případně i obložka s oplachovým roztokem.

NEADHEZIVNÍ PĚNOVÁ krytí na bázi měkkého silikonu

LOKÁLNĚ KORTIKOIDY zvážit krátce na zmírnění svědění po konzultaci s dermatologem.

VLHKÁ DESKVAMACE

Ošetření 2-4x 24-48 hodin, s postupem hojení lze interval prodloužovat.

POZOR NA PŘÍSCHNUTÍ primárního krytí – důkladně navlhčit při snímání.

OCHLAZOVAT A OPLACHOVAT sterilními neдрáždivými roztoky na rány a případně i obložka s oplachovým roztokem.

Opatrně RÁNU ČISTIT.

NEADHEZIVNÍ KONTAKTNÍ MŘÍŽKY, NEADHEZIVNÍ PĚNOVÁ krytí na bázi měkkého silikonu

Nepoužívat vazelinu, standardní gázu ani okluzivní materiály, leukoplasty.

INFEKCE, ULCERACE, NEKRÓZA

Ošetření 2-4x 24-48 hodin, s postupem hojení lze interval prodloužovat.

OPLACHOVÉ ROZTOKY A OBLOŽKY, přípravky se singleto-ovým kyslíkem, antimikrobiální přípravky.

Opatrně RÁNU ČISTIT.

V případě zápachu – KRYTÍ S AKTIVNÍM UHLÍM.

Při ozařování ponechávat POUZE KRYTÍ ATESTOVANÉ NA POUŽITÍ I PŘI OZAŘOVÁNÍ. Přípravky se stříbrem lze pouze po ukončení radioterapie (individuálně v případě putridní infekce s nekrózou lze po domluvě s radioterapeutem využít na nezbytnou dobu do zlepšení stavu).

KRVÁCENÍ

LOKÁLNÍ APLIKACE HEMOSTYPTIKA např. etamsylát inj. sol. na čtverečku či tamponu.

POZOR NA PŘÍSCHNUTÍ primárního krytí – důkladně navlhčit při snímání.

OPLACHOVÉ ROZTOKY.

NEADHEZIVNÍ KONTAKTNÍ MŘÍŽKY, neadhezivní pěnová krytí na bázi měkkého silikonu
Při ozařování ponechávat POUZE KRYTÍ ATESTOVANÉ NA POUŽITÍ I PŘI OZAŘOVÁNÍ.

POSTIŽENÍ DUTINY ÚSTNÍ PŘI ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ

VELMI RIZIKOVÉ SITUACE

- transplantace krevtvořných buněk, intenzivní nebo vysokodávkovaná chemoterapie
- radioterapie do oblasti dutiny ústní
- chemoterapie nebo cílená léčba s současně např. malhygienu dutiny ústní a chrupu, malignta v dutině ústní, kortikosteroidy, malnutrice, diabetes, radioterapie na oblast dutiny ústní v minulosti



HODNOCENÍ TÍŽE POSTIŽENÍ DUTINY ÚSTNÍ

WHO (World Health Organization) [1, 2]	
Stupeň	Popis
0	Bez změn
1	Bolestivost, erytém, bez defektů
2	Defekt, ale pacient schopný jíst tuhou stravu
3	Defekt, pacient neschopný jíst tuhou stravu, ale tekutiny a kaše ano
4	Defekt, perorálně nemožnost přijímat ani tekutiny pro postižení mukozitou

NCI-CTCAE (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events) v 5.0 2017 [3]	
Stupeň	Popis
0	Bez změn
1	Asymptomatická mírná projev (nevyžadující intervenci)
2	Mírná bolestivost nebo defekt bez omezení perorálního příjmu, jen úprava stravy nutná
3	Výrazná bolest omezuje perorální příjem
4	Život ohrožující nálezy, urgentní intervence indikována
5	Úmrtí

PŘÍKLADY POSTIŽENÍ DUTINY ÚSTNÍ



DOMÁCÍ BIKARBONÁTOVÉ 1% ROZTOKY

1. Polovina čajové lžičky (2,5 ml) jedlé kuchyňské sody (soda bikarbona, vitar soda) rozpustit do 250 ml převařené vody.

2. Hydrogenuhličitan sodný NaHCO₃ 8,4 % 100 ml do 1000 ml sterilní vody. [4]

Literatura:
[1] World Health Organization. WHO handbook for reporting results of cancer treatment. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1999.
[2] NCI-CTCAE v5.0. National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v5.0. November 27, 2017. Available at: <http://ctcae.fda.gov/ctcae/>.
[3] National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v5.0. November 27, 2017. Available at: <http://ctcae.fda.gov/ctcae/>.
[4] National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v5.0. November 27, 2017. Available at: <http://ctcae.fda.gov/ctcae/>.



POSTIŽENÍ DUTINY ÚSTNÍ PŘI ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ – ZÁKLADNÍ MOŽNOSTI V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI

Uvedené postupy a roztoky vycházejí z odkazu na literaturu uvedenou níže a nenahrazují potřebu individuálního rozhodnutí a vedení péče u konkrétního pacienta. Aktivní spolupráce pacienta je důležitá a péče ošetřujícího personálu u pacientů s omezenou sebezvládnutí je zásadní. Receptury uvedených roztoků jsou standardní a dostupné u Sekce podpůrné léčby a péče COI (www.links.cz). FR-fyziologický roztok.


1

EDUKACE, OVĚŘENÍ SEBEPÉČE A STAVU DUTINY ÚSTNÍ

- 1.1 Poučte a informujte** (leták, brožura, web) o možném postižení dutiny ústní, možné péči a úpravě stravy: vyprázdnění, např. následně u stomatologa před onkologickou léčbou, cílené chrupu, atepř. 2x denně po jídle, měkký zubní kartáček, vyplachy a kloktání dutiny ústní (chladnější roztoky vhodnější), úprava stravy a nutriční podpora.
- 1.2 Opakovaně ověřujte schopnost** sebezpečí pacienta, hygienu a stav dutiny ústní, možnost příjmu stravy, tekutin a léků.

2

PREVENCE U VYBRANÝCH SITUACÍ (vyplachy a kloktání)



3

ZÁKLADNÍ INTERVENCE PŘI POSTIŽENÍ DUTINY ÚSTNÍ

- 3.1. Provedení ošetření na kultivace** bakteriologie a mykologie při nálezu hnisavých ranek nebo povlaků.
- 3.2. Úprava stravy** jídla měkká, kašovitá, tekutá polévky, pyré, jogurty, pudinky, krémy, měkké syry, pasty, dýně, pečivo namočené a hodně zapít, zmraziny, přezrálé ovoce, nutriční podpora – sipping, konzultace nutričními.
- 3.4. Chlazení sliznic:** chladná voda, FR, žele, chladnější mléko, jogurty, nůrky, zmraziny, pyré.
- 4.5. Roztoky a gely:** nežalší, chlazení nebo pokojová teplota, po jídle (není-li určeno jinak), bez omezení lze např. vodu (ideálně balená, 0 převařená) a FR, roztoky s bikarbonátem (1%) 4-10x denně, dále pak dle doporučení výrobce.
- 5.5. Hygiena ot a chrupu:** pravidelně, vyplachy a kloktání, neodstraňovat nálezy povlaků, je-li krvavost nebo bolest pak vyplachy a oírání šišičkou (např. chlorhexidin 0.12% nebo gel 1%, singletový kyslík), promáčení rtů.

4

SPECIFICKÉ INTERVENCE U VYBRANÝCH SITUACÍ (vyplachy a kloktání)



POSTIŽENÍ DUTINY ÚSTNÍ PŘI ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ



PRŮVODCE POSTIŽENÍM DUTINY ÚSTNÍ PŘI ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ

Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Průvodce postižením dutiny ústní při onkologické léčbě

Úvod

Postižení dutiny ústní je jedním z možných problémů, které mohou některé z pacientů během onkologické léčby potkat v jejím průběhu, případně i s odstupem řady měsíců nebo i let. Je však zcela nepochybné, že dobře poučený pacient a zdravotnický personál mohou společně s využitím dostupných léčebných a ošetrovatelských možností docílit toho, aby riziko a problémy s postižením dutiny ústní co nejvíce snížili.

Obsah

1.	Poznámky k anatomii, mikrobiologii a vyšetření dutiny ústní	7
2.	Postižení dutiny ústní po chemoterapii a radioterapii	8
3.	Infekce dutiny ústní	13
4.	Jiná důležitá postižení v dutině ústní aftózní stomatitida, reakce štěpu proti hostiteli (GVHD), osteonekróza čelisti	14

Bulletin Zahojíme, z.s.

Novinky pro pacienty




Informovanost veřejnosti o patientské organizaci Zahojíme, z.s.

Věnujte nám, prosím, 10 minut a řekněte nám, co víte o Zahojíme.cz. Děkujeme!



Vychází Bulletin Zahojíme

Vychází první číslo informačního bulletinu Zahojíme, který má za cíl informovat Vás o aktuálním dění a zajímavých novinkách v oblasti hojení...



Vzdělávací webinář – dotazník pro pacienty a pečující

Nadace O2 prosí pacienty a především pečující o vyplnění dotazníku, který jim pomůže připravit vzdělávací webinář zaměřený na bezpečí a zdraví v...



Podcast Dva ve zdraví: Chronické rány

Podcast Dva ve zdraví a díl číslo 10 Chronické rány – „Optimismus je důležitý a hlava dělá strašně moc.“


PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY
PhDr. Adéla Holubová, Ph.D., MBA

ČLENOVÉ REDAKČNÍ RADY:
PhDr. Adéla Holubová, Ph.D., MBA
PhDr. Petra Nováková
prof. PhDr. Andrea Pokorná Ph.D.
MSc. Irena Pukiová
MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Grafická úprava:
Ing. Jana Vaňková

- Autory jsou odborníci
- Recenze článků
- Široké využití

<https://www.zahojime.cz/zahojime-z-s/bulletin-zahojime/>


Č. 1/2024
Téma měsíce: Dekubity

Obsah čísla:

- Editorial
- Úvodní slovo výkonné ředitelky
- Téma měsíce – Proleženina – dekubitus
- Konference Hojení ran v kostce a Gerontologický kongres
- Hygiena rány a jejího okolí
- Psychika jako možný pomocník při hojení ran
- Zahraniční okénko: Práce sestry specialistky pro léčbu rány ve Velké Británii
- Léto je plné drobných ran
- Stop dekubitům
- Výzkum v ošetřovatelství je nezbytný
- Stojí za zhlédnutí

Bulletin si můžete také stáhnout v pdf

Přečíst celé číslo


ZAHOJÍME

Pomáháme hojit vaše rány
Bulletin Zahojíme 1/2024


DEKUBITY



2024-01-obalka


Vážení přátelé a příznivci patientské organizace Zahojíme, z.s.,
držte v ruce, vlastně vidíte na obrazovce svého počítače, mobilu nebo tabletu, první číslo informačního bulletinu patientské organizace Zahojíme, z.s., který má za cíl informovat Vás o aktuálním dění a zajímavých novinkách v oblasti prevence a léčby hojení ran.
Pro nás všechny ze Zahojíme (výbor spolku, videickou radu i všechny přátele, spolupracovníky a podporovatele) je to další a důležitý krok na naší cestě, na cestě, jejímž cílem je ulehčit život pacientům s nehojící se ránou a jejich blízkým a upozornit na problematiku nehojících se ran širokou veřejnost, státní správu a další instituce v České republice.
Dovoľte mi zavzpomínat na první kročky, které předcházely tomuto okamžiku.
Nápad začít pomáhat pacientům s nehojící se ránou vznikl v roce 2019 nad fotografiemi neléčených nebo neodborně léčených ran. Tehdy jsme se ptali, jak je možné, že mezi námi žijí lidé s takovým trápením a s pocitem, že jim není pomoci. Lidé, kteří jsou kvůli své nehojící se ráně vyřazeni ze společnosti a nevyhazují z domova. A tak v lednu 2020 vznikl projekt ZAHOJÍME obecně prospěšné společnosti *Dialog Jessenas*. Začali jsme založením webu, sociálních sítí a vrhli se na informování veřejnosti. Důležitým předělem byla naše spolupráce na příčinném společností IPSOS mezi pacienty s chronickými ranami v červnu 2020. Příčinným „*Otevření rány, skrytý trápení, utváření komunity*“ nám poskytl mnoho užitečných dat.
A pak se začaly dít číselní věci! Začali s námi spolupracovat odborníci na hojení ran a svou pomoc a podporu nám dal výbor České společnosti pro léčbu rány. MUDr. Ivo Bureš, Prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (v novém čísle najdete s paní profesorkou rozhovor), MUDr. Jan Štrýja, Ph.D. (*autor kurzu Hojení ran E3000*) a později také odborníci z České onkologické společnosti prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. a další špičkoví odborníci, nám dodali expertizu a směr.
V roce 2020 jsme iniciovali online *kurz Hojení ran* ve spolupráci s elektronickou univerzitou ELNI a začali jsme jezdit na konferenci a kongresy, v roce 2021 jsme se poprvé *představiteli na konferenci EPJAP* (Evropský poradní panel pro otázky dekubitů) s videem „*Our life with pressure ulcers – the patient perspective*“, a pomáhali pacientům s nehojící se ranou v době covidové.
Zlomový byl rok 2022, kdy náš tým obohatil velkou energii a vysokou odborností specialistky na hojení ran PhDr. Adéla Holubová, Ph.D., MBA, naše výkonná ředitelka, a prim. MUDr. Kateřina Jirsová, předsedkyně spolku, které dokázaly naše sny realizovat. V lednu 2023 bylo zapříčiněno Zahojíme, z.s. a letos v červnu se stalo skutečnou patientskou organizací zapsanou do seznamu patientských organizací Ministerstva zdravotnictví ČR.
První číslo našeho bulletinu se podrobně věnuje *dekubitům* (proleženinám), kromě klasifikace a doporučení péče o pacienty, si mohou odborníci vyzkoušet určování kategorie dekubitů *v našem testu*.

Přidat dekubity



Další možností prevence dekubitů na patkách je použití patní botičky Z-Flex, která obsahuje vzduchové lamely a fluidní polohovací podložku, jež umožňuje plně odlehčit patu a rozložit tlak vyvíjený na Achillovu šlahu. Integrovaná vzduchová komora také pomáhá podepřít dolní končetinu a zabránit nadměrné extenzi kolena.

Zdroj: DiaPodi care


PRO ZDRAVOTNÍKY:

Chcete si vyzkoušet určování kategorie dekubitů?

Klikněte zde a zkuste si náš test

<https://www.zahojime.cz/zahojime-z-s/bulletin-zahojime/>

✓ Vyberte tvrzení, které nejvíc vystihuje dekubitus na obrázku *

1/1



- ☐ Dekubitus III. kategorie – úplná ztráta kožního krytu
- ☐ Podezření na hluboké poškození tkání
- ☒ Dekubitus IV. kategorie – úplná ztráta kožního krytu a tkáně v plné tloušťce ✓

Zpětná vazba

Ano, správně. Vysvětlení: na spodině dekubitu jsou viditelné svaly a kost křížová.

✗ Vyberte tvrzení, které nejvíc vystihuje dekubitus na obrázku *

0/1



- ☐ Dekubitus III. kategorie – úplná ztráta kožního krytu
- ☒ Podezření na hluboké poškození tkání ✗
- ☐ Dekubitus IV. kategorie – úplná ztráta kožního krytu a tkáně v plné tloušťce

Správná odpověď

- ☒ Dekubitus IV. kategorie – úplná ztráta kožního krytu a tkáně v plné tloušťce

Zpětná vazba

To není správně, správná odpověď je č. 3.
Vysvětlení: na spodině dekubitu jsou viditelné svaly a kost křížová.

Další vydání bulletinu pro vás připravujeme v prosinci

Máte návrhy na témata do dalších bulletinů, jiné připomínky? Zajímá vás nějaké konkrétní téma, máte jiné dotazy či připomínky, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: info@zahojime.cz



www.zahojime.cz



PŘESEDNA REDAKČNÍ RADY
PhDr. Adéla Holubová, Ph.D., MBA

ČLENOVÉ REDAKČNÍ RADY:
PhDr. Adéla Holubová, Ph.D., MBA
PhDr. Petra Nováková
prof. PhDr. Andrea Pokorná Ph.D.
MSc. Irena Pukiová
MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

Grafická úprava:
Ing. Jana Vaňková

Číslo 1/2024
1. Vydání, Sezimovo Ústí, 2024

© 2024 Zahojíme, z.s. Všechna práva vyhrazena.

STRUČNÁ DOPORUČENÍ PRO
PACIENTY S DIABETEM A SYNDROMEM
DIABETICKÉ NOHY

PREVENCE A PÉČE O NOHY PRO DIABETIKY



ZAHOJÍME
WWW.ZAHOJIME.CZ



DIABETES

Diabetes mellitus, nebo-li cukrovka, je celoživotní onemocnění projevující se zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi.

DOPORUČENÍ: udržení normální hodnoty krevního cukru (normoglykémie), léčba přidružených onemocnění a rizikových faktorů – léčba vysokého tlaku, vysokých tuků v krvi, snížení hmotnosti a stop kouření.

SYNDROM DIABETICKÉ NOHY

Syndrom diabetické nohy je jednou z nejobávanějších pozdních komplikací diabetu. Jedná se o poškození tkání nohy od kotníku směrem dolů, spojené s různým stupněm poškození cév a nervů u pacientů s diabetem. Často bývá přítomna infekce. V praxi se jedná nejčastěji o poškození kůže a podkoží (rány), kostí (záněty a/nebo poškození kostí – Charcotova noha) a stavy po amputacích. Onemocnění má tendenci k opakování a lze ho tedy považovat za „doživotní diagnózu“.

DOPORUČENÍ: důkladná prevence, v případě vysokého rizika vzniku syndromu diabetické nohy nebo při jeho rozvoji je nutné sledování v podiatrické ambulanci (na doporučení diabetologa či praktického lékaře).

HLAVNÍ RIZIKOVÉ FAKTORY:



MOŽNÉ NÁLEZY NA DIABETICKÉ NOZE:



SLOVNÍČEK VYBRANÝCH POJMŮ

ISCHEMICKÁ CHOROBA DOLNÍCH KONČETIN

Ischemická choroba dolních končetin je onemocnění, při kterém dochází ke zhoršenému prokrvení tkání dolních končetin. Příčinou je zúžení nebo úplný uzavěr tepen, způsobený nejčastěji aterosklerózou.

DOPORUČENÍ: nekouřit, pravidelný pohyb, vyvážené stravování, redukce hmotnosti, normální hladina cukru, cholesterolu (tuků) v krvi, krevního tlaku, předcházení stresu a užívání léků dle doporučení lékaře. Při zjištění nedokrevnosti je vhodné sledování u cévního specialisty.

DIABETICKÁ NEUROPATIE

Diabetická neuropatie je poškození periferních nervů vlivem dlouhodobě zvýšeného cukru v krvi při diabetu. V oblasti chodidla dochází ke snížení až úplnému vymizení citlivosti (neuropatie se může vyskytovat i na rukách).

DOPORUČENÍ: předcházení vzniku komplikací (prevence) a používání preventivní (zdravotní) obuvi.

CHARCOTOVA NOHA

Charcotova noha (Charcotova osteoartróza) je chronické, progresivní onemocnění kostí a kloubů nohou vznikající na podkladě neuropatie. V akutním stádiu onemocnění je noha oteklá, zarudlá a teplá. Ve chronickém stádiu onemocnění jsou přítomny deformity chodidel, které výrazně zhoršují kvalitu života diabetika. Při podezření na Charcotovu nohu je nutno ihned kontaktovat podiatra.

DOPORUČENÍ: důsledná léčba cukrovky a prevence vzniku Charcotovy nohy.

ZROHOVATĚLÁ KŮŽE

Zrohovatělá kůže (hyperkeratóza) je ztvrdlá, žlutá kůže na ploškách nohou, která může zvýšit riziko vzniku puchýřů a prasklin.

DOPORUČENÍ: pravidelné odstraňování ztvrdlé kůže za pomoci skleněných pilníků nebo přístrojové pedikúry.

PLÍSEŇ (NEHTY, CHODIDLA)

Nehtová plíseň (onychomýkóza) a plíseň chodidel (tinea pedis) jsou onemocnění způsobená plísněmi.

DOPORUČENÍ: prevence, odstranění za pomoci přístrojové pedikúry a denní aplikace protiplísňových (antimykotických) přípravků. Pokud nereaguje na léčbu, navštivte specialistu.

SPECIALIZOVANÉ (PO- DIATRICKÉ) AMBULANCE

Jedná se o specializované pracoviště s odborníky, kteří se zaměřují na pacienty se syndromem diabetické nohy a osoby se zvýšeným rizikem tohoto onemocnění.



AMBULANCE NALEZNETE ZDE:
www.diab.cz/seznam-podiatrickych-ambulan-ci



DOPORUČENÍ V PREVENCI SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY

HYGIENA A KONTROLA NOHOU

- Nohy pravidelně a krátce koupat či sprchovat
- Kontrolovat teplotu vody (pomocí teploměru, nebo loktem – NIKDY ne nohou) – teplota vody by neměla přesahovat 37 °C
- Po hygieně nohy dobře osušit a vysušit mezprstní prostory
- Zkontrolovat a promazat nohy krémem (neaplikovat do mezprstních prostor) nebo pénou určenou na nohy diabetika
- V případě výskytu Charcotovy nohy měřte denně kožní teplotu



PROČ?

Hygiena nohou je důležitá a dochází při ní i ke kontrole nohou samotných. Příliš dlouhé koupele mohou poškodit kůži. Pacienti s diabetem mají často neuropatii, proto by měli před koupelí teplotu vody kontrolovat za pomoci lokte nebo teploměru. Pokud jsou mezprstní prostory vlhké, mohou zde vznikat praskliny či se udržovat plíseň. Prasklinami (ragádami) mohou do kůže vniknout patogeny a způsobit infekci. Pokud si na nohy nevidíte, použijte zrcátko nebo požádejte rodinného příslušníka o pomoc.

PREVENTIVNÍ OBUV (ZDRAVOTNÍ/DIABETICKÁ)

- Preventivní obuv musí mít dostatečný prostor pro prsty, svršek na suchý zip či šněrování, prodyšný materiál (kůže, neopren) a podátek by neměl být vyšší než 2,5 cm.
- Vnitřek boty musí být jemný, hladký, nesmí tam být žádné švy, musí mít protiskluzné vlastnosti, obuv musí být vybavena vyměnitelnými stélkami, které musí být schopny rozkládat vzniklé vysoké lokální tlaky apod.
- Zákaz nošení otevřených střihů obuvi ve venkovních prostorech, používání gelových, magnetoterapeutických nebo masážních stélek
- Před každým obutím důkladně prohlédnout vnitřek obuvi, zda v ní není nějaký cizí předmět nebo poškozená vnitřní část obuvi
- Nenosit novou obuv celý den, novou obuv vybírat/kupovat spíše odpoledne a vždy po rádném změření nohy



PROČ?

Nové boty noste nejprve doma např. 10 minut, poté je vyzuňte a toto opakujte několikrát denně, několik dní, než se nová obuv „přizpůsobí“ vaší noze. Tento postup je prevencí vzniku ran z nové obuvi. Nenoste otevřenou obuv, a to z důvodu prevence vniknutí cizího tělesa (kamínky, větvička) do boty a následného vzniku rány.



Pacient s diabetem má nárok na finanční příspěvek od své pojišťovny na speciální obuv. Může být předepsáno diabetologem, chirurgem, ortopedem nebo angiologem.

ODLEHČENÍ

- Snížení tlaku na ránu je jednou z nejdůležitějších součástí léčby syndromu diabetické nohy.



NEZAPOMEŇTE:
„CO KROK,
TO DEN
HOJENÍ
NAVÍC!“

PROČ?

Zvýšený tlak na ránu má nepříznivý vliv na proces hojení, jelikož při každém kroku se rána pohybuje. Odlehčovací pomůcky by měl pacient používat nejen při pohybu venku, ale i v domácím prostředí. To, že pacienta rána při došlapu neboli neznámá, že se hojí. **Nezapomeňte, že pacienti s diabetickou neuropatií mají porušenou citlivost nohou a nevnímají nadměrný tlak vyvíjený na ránu!**



PREVENTIVNÍ ČI LÉČEBNÉ CHIRURGICKÉ ZÁKROKY

NÁPRAVA:

- postavení prstů (klavíkové prsty, vbočené palce)
- deformity nohy (Charcotova noha)



Červeně vyznačená místa naznačují, kde dochází k přetížení a tím k potenciálnímu vzniku ran dané části nohy



CVIČENÍ

Alespoň 5 min denně procvičujte nohy např.: ohýbání prstů, uchopení malých předních prstů, masírování nohou na válcovém předmětu, kroužení v kotnících. V případě rány na noze provádějte tyto cviky v sedě a pouze se zdravou nohou.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

- Kompenzace diabetu a dalších nemocí
- Přiměřená fyzická aktivita, která významně nezatěžuje nohy – cyklistika, spinning, veslování, plavání (pozor na zvýšenou vlhkost chodidel při sportovních aktivitách, používejte kvalitní ponožky, po sportu nohy vždy umyjte, důkladně vysušte celá chodidla včetně prostorů mezi prsty a zkontrolujte stav nohou)
- Každodenní cvičení a masáž chodidel
- Sprchování nohou ve střídající se teplé a studené vodě
- Zdravá strava
- Nekouřit
- Pozitivní přístup k životu



SLEDOVÁNÍ DIABETIKA VE SPECIALIZOVANÝCH PORADNÁCH

- Při každé kontrole v diabetické poradně by mělo být provedeno alespoň základní vyšetření nohou a pacient by měl být poučen o správné péči o nohy a prevenci syndromu diabetické nohy
- V případě, že diabetik má syndrom diabetické nohy měl by být sledován v podiatrické ambulanci. Po zhojení rány by měl docházet k pravidelným kontrolám v rozsahu 1–3 měsíci
- V případě, že diabetik má ischemickou chorobu dolních končetin měl by být sledován i v cévní poradně



PÉČE O NOHY PRO DIABETIKY



✓
NOHY SPRCHUJTE NEBO
KOUPEJTE KRÁTČE
VE VLAŽNÉ VODĚ



✓
PO KOUPELI DÚKLADNĚ
VYSUŠTE TAKÉ MEZIPRSTNÍ
PROSTORY



✗
NECHOŤTE NABOSO
(ANI DOMA)




✗
NEZAHŘÍVEJTE NOHY U OHNĚ,
TOPENÍ ANI TERMOFOREM



✓
CHODIDLA POMÁZÁJTE
PRODUKTY URČENÝMI PRO
NOHY DIABETIKŮ



✓
PRAVIDELNĚ ODSTRAŇUJTE
HYPERKERATÓZY (SKLENĚNÝM
PILNÍKEM)




✗
PEDIKÚRU NEPROVÁDĚJTE
OSTŘÍMY PŘEDMĚTY



✗
POZOR NA OMRLZINY



✓
DENNĚ KONTROLUJTE
NOHY



✓
NEHTY STRÍHEJTE
DO ROVNA



✗
NESTRÍHEJTE NEHTY PŘÍLIŠ
NAKRÁTKO A DO KULATA



✗
I MALÉ RÁNY
POZORNĚ SLEDUJTE



✓
KONTROLUJTE VNITŘEK
OBUVI



✓
NOSTE VHDNOU OBUV
S DOSTATKEM PROSTORU



✗
NEVHDNÁ OBUV
OMEZUJE CHODIDLO
A ZPŮSOBUJE RÁNY



✗
POZOR NA OTOK,
ZMĚNU BARVY, ZARUDNUTÍ,
PROTEPLNÍ A ZOURENÍ



✓
NOSTE SVĚTLÉ BAVLNĚNÉ
PONOŽKY SE ZDRAVOTNÍM
LEMEM



✓
KOMPENZUJTE CUKROVKU
A DALŠÍ NEMOCI



✗
JEZTE PESTŘE A ZDRAVĚ



✗
NEKUŘTE

CO DĚLAT, KDYŽ...

OBJEVÍTE DROBNÉ RÁNY NEBO PUCHÝŘE:

- omyjte vodou a mýdlem
- vydezinfikujte
- zalepte či překryjte sterilním čtvercem a fixujte obvazem

Pokud se rána nezlepšuje do 3 dnů nebo se
zhoršuje, navštivte svého lékaře.

OBJEVÍTE JAKÉKOLIV ZNÁMKY INFEKCE NEBO ZHORŠOVÁNÍ RÁNY:

- otok, zarudnutí, zduření okolí, proteplení, prohloubení rány, zápach z rány, hnisavá sekrece, změna barvy rány, objeví se zimnice, zvýšené teploty až horečky, třesavky, hyperglykemie (vysoká hladina cukru v krvi)
- **POZOR: Diabetik nemusí mít horečky, ale přesto již může mít závažný zánět!**

Navštivte svého lékaře do 24 hodin.

NÁHLE SE OBJEVÍ KTERÝKOLIV Z NÁSLEDUJÍCÍCH SYMPTOMŮ:

- nově otok
- chladná noha
- nově silná bolest
- změna barvy kůže
- nemožnost pohybu nohy

Okamžitě navštivte svého ošetřujícího lékaře
nebo chirurgickou ambulanci či volejte 155.


Nedostatečná prevence, zanedbané rány,
špatná kompenzace cukrovky, vysokého
tlaku, hladiny cholesterolu v krvi, nespolu-
práce pacienta může vést k amputacím.

Hlavní autorka: PhDr. Adéla Holubová, Ph.D., MBA
Spolautoři: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.; MUDr. Jan Štrýja, Ph.D.;
prof. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.; MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
Datum vydání: 1. vydání, Sezimovo Ústí 2024
Grafika: Ing. Jana Vaňková




www.zahojime.cz






1/2024



9/2024



- Hlavní město Praha
- Jihočeský kraj
- Jihomoravský kraj
- Karlovarský kraj
- Kraj Vysočina
- Královéhradecký kraj
- Liberecký kraj
- Moravskoslezský kraj
- Olomoucký kraj
- Pardubický kraj
- Plzeňský kraj
- Středočeský kraj
- Ústecký kraj
- Zlínský kraj



STAŇTE SE JEDNÍM Z NÁS

Pacientská organizace Zahojíme, z.s. je samosprávným dobrovolným sdružením osob a organizace založená k naplňování zájmů a potřeb nejen jeho členů.

Jsme profesionální patientská organizace s podporou odborných společností a širokou patientskou a pečující základnou. **Pomozte nám a staňte se naším členem.**

Účelem naší organizace je vyvíjet činnost zahrnující zastupování, podporu a prosazování zájmů a komplexních potřeb pacientů a pečujících s nehojící se ránou.

Chcete se stát členem Zahojíme, z.s.?

Přihlášku můžete vyplnit na webu www.zahojime.cz/zahojime-z-s/prihlaska



Výše členského poplatku pro rok 2024:
Číslo účtu pro platbu je: **6390224399/0800**
Jako variabilní symbol uveďte:
jméno, příjmení, rok narození



Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat info@zahojime.cz

V případě, že byste chtěli věnovat Pacientské organizaci Zahojíme, z.s. peněžní dar, prosím, neváhejte kontaktovat výkonnou ředitelku PhDr. Adélu Holubovou, Ph.D., MBA adela.holubova@zahojime.cz

Předem Vám velmi děkujeme!

Pacientská organizace Zahojíme, z.s.

Sídlo: Dukelská 642/3, 391 02 Sezimovo Ústí

IČO: 17865590

Právní forma: Spolek



Děkujeme za podporu

Odborný partner

STAŇTE SE JEDNÍM Z NÁS

POUŽITÉ ZDROJE

MURPHY C., et al., 2020. International consensus document. Defying hard-to-heal wounds with an early antibiofilm intervention strategy: wound hygiene. *J Wound Care* 2020; 29(Suppl 3b):S1–28.

STRYJA, J. et al., 2011. *Repetitorium hojení ran* 2. 1. vyd. Praha: Geum. 371 s. ISBN 978-80-86256-79-5.

STRYJA, J., 2022. Povrchově aktivní oplachové roztoky a jejich místo v léčbě ran. In: XVII. Konference Wound Managementu: Komplexní přístup při léčbě ran. *Mariánské Lázně 16. - 17. června 2022*

SULEYMAN, G., et al., 2018. The Role of Environmental Contamination in the Transmission of Nosocomial Pathogens and Healthcare-Associated Infections. *Current Infectious Disease Reports*. 20(12), 1–12. ISSN 1523-3847

World Union of Wound Healing Societies, 2016. Florence Congress, Position Document. Advance in Wound Care: The Triangle of Wound Assessment [online]. *Wounds Int.* [cit. 2020-07-24]. Available online: https://www.coloplast.sg/Documents/Wound/WUWHS_POSITION%20DOCUMENT.pdf



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

PHDR. ADÉLA HOLUBOVÁ, PH.D., MBA

M. +420 774 672 220

E: ADELA.HOLUBOVA@ZAHOJIME.CZ

W: ZAHOJIME.CZ

