

Léčba opioidy v domácím prostředí

Alžběta Marková, MAS (in Palliative Care)

8.11.2024

Omamné látky

- Zákon o návykových látkách č. 167/1998 Sb.
- Zákon č. 366/2021 Sb. upravuje a aktualizuje výše uvedené

Lékař předepisuje na speciální elektronický recept nebo v mimořádných případech i v listinné podobě tzv. s modrým pruhem

Pokud je lék vydán na recept lékařem, odpovědnost za další uchování a užívání je na pacientovi – zákon upravuje povinnost pacienta poučit (lékař i farmaceut).

Analgetika s obsahem omamných látek

Účinná látka:

- Fentanyl –TDM systém, další lékové formy (Adolor, Dolforin, Effentora, Vellofent, Matrifen, Pecfent, Menasu, Lunaldin)
- Buprenorfin – TDM systém (Transtec, Bupretec), Subuxone tbl –
léčení závislosti
- Hydromorfon – Palladone SR tbl,
- Oxycodone – Oxycontin tbl
- Morphin – Morfin sulfát gtt, Sevredol tbl, Vendal, inj.
- Kombinované preparáty s naloxonem – Targin, Oxycomp, Duoxona,
-

Analgetický žebříček WHO

1 mírná

Paracetamol

Metamizol

ASA a NSAID

± *koanalgetika*

2 středně

Kodeine

Dihydrokodein

Tramadol

Tilidin

± *koanalgetika*

3 silná

Morfin

Fentanyl

Oxykodon

Pethidin

Hydromorfon

Metadon

± *koanalgetika*

Obecné zásady podávání analgetik s obsahem OL

- Dodržovat ordinace lékaře (dávka, indikace, časový interval)
- Sledovat účinek jednotlivých léků
- Sledovat nežádoucí účinky
- Otevřená komunikace s pacientem a pečujícími
-

Specifika podávání analgetik s obsahem OL

- Farmakokinetika léků:
 - TDM systém,
 - tbl s řízeným uvolňováním,
 - rychle působící analgetika
- Účinek a indikace:
 - Silná bolest
 - Dušnost v nízkém dávkování
 - Nepůsobí na neuropatickou bolest
- Sledování a řešení nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky opioidů

Pravidelné a trvalé

- obstipace

Přechodné a počáteční

- Nevolnost, zvracení
- Ospalost, únava
- Zmatenost, delirium
- Močová retence

Ojedinělé


- sucho v ústech
- pocení
- myoklonus
- halucinace

- účinek na dechové centrum(u chronického podávání je riziko velmi nízké).

Některé mýty o opioidech

- Dostal Morfin a zemřel.
- Pokud dostanu Morfin a je mi nevolno a zvracím, mám alergii na Morfin a nesmím ho užívat.
- Mám dnes nalepenou náplast na bolest, ale pořád mne to bolí. Neúčinkuje na mne.
- Po Morfinu hned usnul, dostal moc velkou dávku.
- Bolest musím překonat, pokud bych užíval léky, tak si na ně navyknu a už mi nebudou lékaři mít co dát.
- Pokud budu používat opioidy, vypěstuji si k rakovině a bolesti ještě závislost.
-
-

Prostor pro Vaše dotazy



Děkuji za pozornost